

## Domande relative alla specializzazione in: Pediatria

### Domanda #1 (codice domanda: n.1171) :

Quale, tra le alternative terapeutiche proposte è la più appropriata nel trattamento della chetoacidosi diabetica?

- A: Somministrazione di liquidi, elettroliti e insulina endovena, regolata dal monitoraggio degli esami ematochimici
- B: Abbondante idratazione per os e somministrazione di insulina endovena
- C: Dieta a ridotto contenuto di zuccheri semplici e somministrazione di insulina sottocute, in base al monitoraggio glicemico
- D: Diggiuno e somministrazione di insulina endovena, regolata dal monitoraggio degli esami ematochimici

### Domanda #2 (codice domanda: n.1172) :

Quale dei seguenti segni clinici NON rientra tra i criteri diagnostici di Sindrome di Kawasaki?

- A: Miopia
- B: Mucosite
- C: Linfadenopatia
- D: Congiuntivite

### Domanda #3 (codice domanda: n.1173) :

Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti l'esantema subitum NON è vera?

- A: Solitamente esordisce con un esantema morbilli-rubeoliforme che scompare dopo 24-48 ore, seguito da sintomi quali iperpiressia, faringodinia, astenia, congiuntivite
- B: Il periodo di incubazione oscilla tra i 5 e i 15 giorni
- C: Si ritiene che sia causato dall'Herpes Virus Umano tipo 6B (HHV-6B)
- D: Si verifica di solito tra i 6 e i 18 mesi di età

### Domanda #4 (codice domanda: n.1174) :

La chiusura del dotto arterioso dopo la nascita avviene per costrizione delle pareti stesse, che sono sensibili a quali dei seguenti stimoli?

- A: Aumento di ossigeno e bradichinine e diminuzione delle prostaglandine di origine materna
- B: Aumento di bradichinina e prostaglandine, diminuzione della noradrenalina
- C: Diminuzione della carbossiemoglobinemica, aumento della noradrenalina
- D: Aumento di ossigeno, bradichinine e noradrenalina

## Scenario 1:

Un bambino di 3 anni viene portato in visita per febbre e forti dolori a un orecchio da molte ore. Il bambino è molto agitato e all'otoscopia si osserva membrana timpanica iperemica ed estroflessa con versamento essudativo nella cavità timpanica.

Domanda #5 (codice domanda: n.1175) - (riferita allo scenario n.1) :

Tutti i seguenti farmaci possono trovare indicazione in questo caso tranne:

- A: fluconazolo
- B: cefuroxima
- C: amoxicillina
- D: amoxicillina/ac. clavulanico

## Scenario 2:

Una ragazza di 13 anni presenta dolore puntorio all'emitorace sinistro, comparso improvvisamente dopo un colpo di tosse. All'esame obiettivo si evidenzia un habitus marfanoido e all'auscultazione del torace una riduzione del murmure vescicolare nel quadrante superiore posteriore dell'emitorace sinistro, con FVT abolito e suono plessico timpanico.

Domanda #6 (codice domanda: n.1176) - (riferita allo scenario n.2) :

La diagnosi più probabile è:

- A: pneumotorace spontaneo
- B: dolore intercostale
- C: focolaio broncopneumonico sinistro
- D: pleurite sinistra

## Scenario 3:

Viene condotta alla vostra osservazione una bambina di 3 anni per scarso accrescimento ponderale. La madre riferisce che da un anno la bambina presenta evacuazioni frequenti (2-3 volte/die) di feci semi liquide, abbondanti e maleodoranti. Si alimenta regolarmente, con appetito.

Domanda #7 (codice domanda: n.1177) - (riferita allo scenario n.3) :

Tra quelle elencate, qual è l'ipotesi diagnostica più probabile?

- A: Malattia Celiaca
- B: Gastroenterite acuta
- C: Rettocolite Ulcerosa
- D: Intolleranza al lattosio

Domanda #8 (codice domanda: n.1178) - (riferita allo scenario n.3) :

Quale indagine programmereste in prima battuta?

- A: Dosaggio degli anticorpi anti-transglutaminasi IgA associato al dosaggio delle IgA totali
- B: Calprotectina fecale
- C: Biopsia della mucosa intestinale
- D: Dieta priva di glutine

## Scenario 4:

Bambino di 8 anni viene condotto alla vostra attenzione per alcune problematiche segnalate dalle insegnanti tra cui viene riferito che spesso si distrae e rimane con lo sguardo fisso qualche secondo senza rispondere ai richiami. Ha difficoltà nell'apprendimento e nella memorizzazione. L'EEG mostra, alla prova dell'iperpnea, complessi punta-onda a 3 Hz simmetrici e monomorfi.

Domanda #9 (codice domanda: n.1179) - (riferita allo scenario n.4) :

Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- A: Epilessia generalizzata non convulsiva dell'infanzia con assenze
- B: Epilessia mioclonica giovanile
- C: Disturbo Specifico dell'Apprendimento
- D: Movimenti parossistici non epilettici

## Scenario 5:

Una ragazza di 14 anni, accompagnata dalla madre, viene condotta alla vostra attenzione per amenorrea primaria. L'anamnesi patologica prossima e remota risultano negative. L'epoca della prima mestruazione materna è stata intorno agli 11 anni. La ragazza ha qualche difficoltà scolastica, di lieve entità, e viene riferita come la più bassa fra le compagne.

Domanda #10 (codice domanda: n.1180) - (riferita allo scenario n.5) :

Di fronte a questi primi elementi clinici, quale può essere l'ipotesi diagnostica più verosimile?

- A: Sindrome di Turner
- B: Sindrome di Klinefelter
- C: Sindrome di Down
- D: Sindrome di Prader-Willi